

ORIENTAÇÕES DE COLETA PARA INVESTIGAÇÃO DE ALOPECIA

Confira alguns cuidados a serem tomados na hora da coleta de amostras:

1) Para suspeitas de **ALOPECIA CICATRICAL**

- Lesão única: biopsiar a periferia e o centro da lesão, acondicionando as amostras em frascos separados.

- Lesões múltiplas: biopsiar a periferia de mais de uma lesão, acondicionando as amostras em frascos separados, de acordo com a topografia.

2) Para suspeitas de **ALOPECIA NÃO CICATRICAL**

Biopsiar a área afetada e o occiput, acondicionando as amostras em frascos separados.

3) Em caso de **LESÃO MUITO INFLAMADA**

Biopsiar diferentes áreas da lesão, inclusive a periferia.

| ALOPECIA | LOCAL |
|---|--|
| Androgenética inicial Eflúvio telógeno | Coroa e occipital |
| Areata Tricotilomania | Região central da área afetada e periferia de lesão mais ativa |

Fique atento às observações importantes abaixo:

! O tamanho do fragmento ideal é em formato cilíndrico, retirado com punch dermatológico de 4 mm com representação do tecido adiposo, o mais regular possível e sem torção da porção profunda;

! Fragmentos irregulares, como elipse, navete ou fuso, podem não fornecer os dados suficientes para a conclusão diagnóstica, devendo ser evitados para estudo das alopecias;

! Amostras de diferentes regiões devem ser enviadas em frascos separados com suas topografias devidamente identificadas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do Cipac:

☎ 47 3036-5727

✉ contato@cipac.com.br

De segunda a sexta, das 7h30 às 18h.

